

**LISTE DES VÉRIFICATIONS AVANT D'ENTRER DANS LA CHAMBRE D'UN USAGER SUSPECTÉ OU CONFIRMÉ COVID-19 LORS D'UNE INTERVENTION MÉDICALE GÉNÉRANT DES AÉROSOLS (IMGA) : PRÉCAUTIONS AÉRIENNES/CONTACT RENFORCÉES**

2021-11-29\_Équipe PCI

**IMGA associées à un risque de transmission d'aérosols infectieux :**

- Intubation et extubation  Bronchoscopie  RCR  Ventilation manuelle avant l'intubation  Aspiration des sécrétions trachéales en circuit ouvert chez un intubé ou trachéotomisé  Induction d'expectorations avec instillation de salin
- Aspiration nasopharyngée (APN) chez l'enfant  Autopsie  Interventions chirurgicales par voie naso ou oropharyngée et chirurgie thoracique  BiPAP et CIPAP  Trachéotomie et aspiration profonde des sécrétions par la trachéostomie  Oxygénothérapie par voie nasale à haut débit (p. ex. : Optiflow)  Insertion d'un drain thoracique  Interventions en ophtalmologie qui n'impliquent pas les voies lacrymales, les sinus ou les canalicules  BTTA  Biopsie pulmonaire,  Interventions chirurgicales en ORL ou en dentisterie.
- (N.B. : Retrait de : endoscopie digestive, ETO, laryngoscopie et cardioversion qui ne sont plus considérées comme des IMGA)

**DANS LE CORRIDOR :**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Déterminer les professionnels qui doivent absolument être dans la chambre pour l'intervention   |
| <input type="checkbox"/> | S'assurer de la présence dans la chambre : <ul style="list-style-type: none"> <li>d'une poubelle pour les EPI souillés</li> <li>d'un stéthoscope</li> <li>d'un thermomètre jetable</li> </ul>   |
| <input type="checkbox"/> | d'un distributeur de SHA (solution hydro-alcoolique) près de la porte   |
| <input type="checkbox"/> | S'assurer de la présence dans l'antichambre (ou au corridor à la sortie de la chambre si pas d'antichambre): <ul style="list-style-type: none"> <li>des EPI (N-95 plusieurs formats, lunettes de protection ou visière, gants de nitrile à poignets longs, blouses régulières ou blouses imperméables, papier essuie-mains en quantité suffisante et lingettes désinfectantes)</li> <li>d'une poubelle pour les EPI souillés et d'un distributeur de SHA</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> | Retirer bijoux, montre, téléavertisseur et téléphone  |
| <input type="checkbox"/> | S'attacher les cheveux pour avoir le visage dégagé, s'assurer que la barbe est fraîchement rasée (pour le masque N-95)  |
| <input type="checkbox"/> | Regrouper le matériel requis pour la procédure ou les soins à réaliser  |

**DANS L'ANTICHAMBRE (AU CORRIDOR SI PAS D'ANTICHAMBRE OU DANS L'AIRE D'HABILLAGE SI COHORTE) :**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Pratiquer l'hygiène des mains   |
| <input type="checkbox"/> | Choisir la blouse à revêtir en attachant tous les cordons (s'assurer qu'elle recouvre bien le dos) : Blouse imperméable à usage unique durant la procédure d'IMGA (sauf pour VNI, Optiflow et intubation en circuit fermé) <b>OU</b> si vomissements, diarrhées ou risque important d'éclaboussures. <b>Blouse régulière à usage unique pour les autres situations.</b> |
| <input type="checkbox"/> | Mettre le <u>masque N-95</u> selon la procédure recommandée (inscrire le numéro d'employé et l'étage avec un crayon permanent sur la partie extérieure du masque sous le menton).<br>Si vous portez déjà un masque de procédure, le retirer et mettre le <u>masque N-95</u>   |
| <input type="checkbox"/> | Vérifier l'étanchéité du masque en soufflant (fit-check)  |
| <input type="checkbox"/> | Mettre la visière   |
| <input type="checkbox"/> | Pratiquer l'hygiène des mains   |
| <input type="checkbox"/> | Enfiler les gants de nitrile ou réguliers en s'assurant de bien recouvrir l'extrémité de la manche. Au besoin, percer la manche de la blouse avec le pouce avant de mettre les gants.   |
| <input type="checkbox"/> | Faire des mouvements pour valider le confort de l'équipement  |
| <input type="checkbox"/> | À partir de son entrée dans la chambre de l'usager, l'intervenant ne doit pas toucher son visage, son masque ou toute autre zone non couverte jusqu'au retrait de son EPI   |
| <input type="checkbox"/> | <b>Attendre le OK de l'observateur avant d'entrer dans la chambre</b>   |
| <input type="checkbox"/> | Refermer la porte. En présence de précautions aériennes/contact renforcées, la porte doit demeurer fermée en tout temps   |

**LISTE DES VÉRIFICATIONS À LA SORTIE DE LA CHAMBRE D'UN USAGER SUSPECTÉ OU CONFIRMÉ COVID-19  
LORS D'UNE PROCÉDURE MÉDICALE GÉNÉRANT DES AÉROSOLS (IMGGA):  
AÉRIENNES/CONTACT RENFORCÉES**

**PRÉCAUTIONS**

2021-11-29\_Équipe PCI

**DANS LA CHAMBRE (OU DANS L'AIRE DE DÉSHABILLAGE SI COHORTE) :**

<input type="checkbox"/>	Chaque intervenant procède à tour de rôle au retrait de l'EPI
<input type="checkbox"/>	L'intervenant doit s'assurer d'avoir la distance d'un mètre autour de lui et d'être à 2 mètres des voies respiratoires de l'usager. Si ce n'est pas possible, toutes les étapes doivent être réalisées dans l'antichambre (ou au corridor si pas d'antichambre)
<input type="checkbox"/>	L'intervenant doit avoir à portée de main la poubelle et le distributeur de SHA
<input type="checkbox"/>	Retirer lentement la paire de gants : on doit pincer le 1 <sup>er</sup> gant au poignet, le rouler à l'intérieur de la main gantée souillée et retirer le 2 <sup>e</sup> gant en entrant l'index à l'intérieur du gant contaminé restant
<input type="checkbox"/>	Pratiquer l'hygiène des mains
<input type="checkbox"/>	Retirer lentement la blouse. L'éloigner du corps en la roulant délicatement
<input type="checkbox"/>	Pratiquer l'hygiène des mains
<input type="checkbox"/>	Retirer la visière en tenant l'élastique derrière la tête le plus loin possible du visage et la mettre dans le sac/bac de récupération prévu à cet effet à l'intérieur de la chambre
<input type="checkbox"/>	Pratiquer l'hygiène des mains
<input type="checkbox"/>	<u>Garder le masque N-95</u> , sortir** de la chambre et refermer la porte immédiatement derrière soi
<input type="checkbox"/>	<p>**Étapes pour sortir de la chambre si équipement (ex. : glucomètre) ou prélèvement à sortir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garder le masque N-95</li> <li>- mettre un gant de procédure</li> <li>- prendre l'équipement ou le sac contenant le prélèvement avec la main gantée</li> <li>- ouvrir la porte avec l'autre main</li> <li>- refermer la porte de la chambre avec la main non gantée</li> <li>- ouvrir la porte de l'antichambre avec la main non gantée</li> <li>- si équipement: le déposer sur une table propre à la sortie de la chambre ou le remettre à une personne qui porte des gants propres à la sortie de la chambre pour le désinfecter (ne pas mettre dans un sac)</li> <li>- si prélèvement : déposer le sac dans un autre sac propre (une autre personne en externe tient le sac propre)</li> </ul>

**DANS L'ANTICHAMBRE (AU CORRIDOR SI PAS D'ANTICHAMBRE OU DANS L'AIRE DE DÉSHABILLAGE SI COHORTE) :**

<input type="checkbox"/>	Dire à l'intervenant qu'il est important de ne pas se toucher le visage avec les mains
<input type="checkbox"/>	Pratiquer l'hygiène des mains
<input type="checkbox"/>	Pour retirer le masque N-95 : 1) se pencher légèrement la tête vers l'avant, 2) agripper l'élastique du bas en premier et le ramener vers l'avant en bas du menton en gardant une tension, puis faire la même chose avec celui du haut 3) jeter le masque dans le sac/bac de récupération prévu à cet effet. Ne pas toucher le devant du masque
<input type="checkbox"/>	Pratiquer l'hygiène des mains
<input type="checkbox"/>	Signer le registre de toutes les personnes (travailleurs et visiteurs) entrant dans la chambre

SHA : solution hydro-alcoolique EPI : équipement de protection individuelle