



INFO-MÉDICAMENT

*Document préparé par les départements de pharmacie
et d'inhalothérapie à l'intention des usagers*

COLISTIMÉTHATE (COLY-MYCIN^{MD}) en nébulisation

POSOLOGIE : _____

1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est un antibiotique utilisé comme traitement d'appoint pour le traitement des infections pulmonaires à *Pseudomonas aeruginosa*. Il est utilisé en association avec d'autres traitements dans le but de diminuer la fréquence des infections respiratoires et d'améliorer la fonction pulmonaire.

2. CONSEILS :

- La physiothérapie respiratoire est habituellement effectuée **avant** le traitement avec Coly-Mycin^{md}.
- L'administration de ce médicament est habituellement **précédée** d'une dose de bronchodilatateur en aérosol-doseur ou en nébulisation.
- Si vous prenez un corticostéroïde en inhalation (ex : Pulmicort^{md}, Flovent^{md}, Symbicort^{md}, Advair^{md}, Alvesco^{md}), il est recommandé de le prendre **après** Coly-Mycin^{md}.

Dilution

- Vérifiez la date d'expiration sur la fiole.
- Retirez le capuchon de plastique de la fiole et passer un tampon d'alcool avant de piquer le caoutchouc de la fiole.
- Pour une dose de 75mg 2 fois par jour : préparer 5ml de NaCl 0,9% sans agent de conservation (avec seringue + aiguille) et injecter les 5 ml lentement dans la fiole. Agiter doucement jusqu'à ce que le liquide soit clair et uniforme.
- Pour une dose de 150mg 1 fois par jour : préparer 3ml de NaCl 0,9% sans agent de conservation (avec seringue + aiguille) et injecter les 3 ml lentement dans la fiole. Agiter doucement jusqu'à ce que le liquide soit clair et uniforme.

Administration

- Pour une dose de 75mg 2 fois par jour : à l'aide d'une seringue, **prélevez 2,5 ml (75 mg)** de Coly-Mycin^{md} et mettre dans le nébuliseur.
- Pour une dose de 150mg 1 fois par jour : à l'aide d'une seringue, **prélevez 3 ml (150 mg)** de Coly-Mycin^{md} et mettre dans le nébuliseur.
- La durée du traitement est d'environ 15 à 25 minutes.

- Pour une dose de 75mg 2 fois par jour : respectez un **intervalle d'au moins 8 heures** entre les doses du matin et du soir.

3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- La fiole de poudre de Coly-Mycin^{md} se conserve à la température pièce.
- La fiole de Coly-Mycin^{md} **diluée se conserve uniquement 24 heures au réfrigérateur**, à l'abri de la lumière.
- L'oubli fréquent des doses de Coly-Mycin^{md} risquent de rendre les bactéries davantage résistantes. Trouvez-vous des trucs pour penser à prendre votre antibiotique.

4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :

- Ce médicament est **généralement bien toléré**.
- En début de traitement, vous pourriez présenter de la toux.

5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Une aggravation de votre condition.
- Une persistance d'un effet secondaire incommodant.